

原位杂交固定液（动物）产品说明书

产品信息

产品名称 (Name)	产品货号 (Cat)	规格(Size)
原位杂交固定液 (动物)	P0113-500ml	500ml

使用方法

组织取材后迅速投入本产品中，固定液是组织体积的20倍最好，组织块厚度小于5 mm最佳，固定时间24小时以上，若组织比较大，可适当延长固定时间。

注意事项

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；请在通风良好的环境下使用。
- 固定液使用后请及时拧紧瓶盖，防止有效成分挥发。
- 确保组织固定充分，固定过程切勿冷冻结冰。

产品简介

组织固定的作用一般是为了保持组织细胞的固有形态和结构，防止细菌的腐蚀和组织细胞的自溶，保存细胞内固有的物质，使细胞内蛋白质凝固，尽量减少或终止内源性及外源性酶的反应，使细胞或组织基本上保持与生活时的物质一样，还能使组织硬化，便于组织的修切。对于某些具有传染性的标本，能防止疾病的扩散；保存好大体标本。并且经过固定之后的样本可以增强染色的作用。

本产品主要有效成分为多聚甲醛和磷酸盐缓冲液，采用DEPC水配制，室温25°C时测PH=7.0-7.5，适用于大部分需要做原位杂交相关实验的动物组织的固定。

储存与运输

常温运输；阴凉干燥处保存，避免阳光直射，有效期24个月。

本产品仅供科研使用，不用于临床诊断！

(产品包装升级中，请以实物为准)

武汉总部实验中心 感谢您选择本公司，使用前请详细阅读使用说明书。

地址：武汉市东湖新技术开发区神墩四路666号国英种业A区14楼
许经理电话13545919059



企业公众号

企业微信

武汉总部实验中心 感谢您选择本公司，使用前请详细阅读使用说明书。

地址：武汉市东湖新技术开发区神墩四路666号国英种业A区14楼
许经理电话13545919059



企业公众号

企业微信